

המלצות לניהול עורי למשך הטיפול בפרודואדופה

הגיינה בזמן הטיפול

- רחיצת ידיים עם סבון
- חיטוי מקום ההחדרה עם מגבון אלכוהול
- הימנעות ממגע בקצה הקנולה

הכנת העור מראש

- שמירה על לחות באזורים מועדים
- הסרת שיער בגזירה או קרם, **לא בגילוח**
- אם יש עור סדוק – יש לטפל מראש

שגרה יומית מומלצת

- ניקוי האזור בבוקר
- מריחת קרם לחות
- בדיקת סימנים חדשים בעור

בחירת מקום עירוי

מקום עם מספיק שומן תת-עורי (בטן עליונה) הימנעות מאזורים עם קפלי עור, צלקות או שיער רב


החלפת מיקום הקנולה

מומלץ להחליף מקום לפחות כל 3 ימים או לפי המלצות הצוות הרפואי

עיסוי לאחר הסרת הקנולה

מסייע בספיגת שאריות תרופה מונע היווצרות גושים ונודולים

מקומות הזרקה אלטרנטיביים



שאלון מעקב עצמי

מה עושים?	תסמין
קומפרס, סטרואיד	אודם
עיסוי, מעקב	נפיחות
רופא מיון	חום סיסטמי, מוגלה

המלצות כלליות

- ביקור אצל רופא עור פעם בשנה
- דיווח על כל נגע חדש או משתנה
- צילום איזור העירוי כל מספר ימים לתיעוד ולמעקב

המלצות אלו נכתבו ע"י דרמטולוג מומחה עבור תוכנית AbbVie Care יש לעיין בעלון לצרכן של התכשיר לפני השימוש. לקבלת עלון לצרכן ניתן לפנות לאתר מאגר התרופות של משרד הבריאות או לבעל הרישום חברת אבווי ביופארמה, רחוב החרש 4, בניין D, ת.ד. 1014, הוד השרון 4511001, טלפון: 09-7909600. Produodopa תמיסת עירוי תת עורי הניתן באופן מתמשך על-פני 24 שעות בעזרת משאבה ייעודית. חומרים פעילים: פוסלבדופה 240 מ"ג/מ"ל, פוסקריבדופה 12 מ"ג/מ"ל